

骨粗しょう症の患者さんへ

骨粗しょう症の
治療を始める方、治療中の方は、

歯科医院で

お口のチェックを

受けましょう。



骨粗しょう症治療薬
錠を服用の患者さんへ
ご注意ください

服用開始前
●医師と相談の上、必要に応じて抜歯などの歯科治療は服用を始める前に済ませてください。

服用中
●ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
●歯科検診に行くなど口腔内を定期的にチェックしてください。
●抜歯などの治療はできるだけ受けないようにしてください。
●「あごの痛み、歯のゆるみ、歯ぐきの腫れ」などの症状があらわれた場合は医師、歯科医師、薬剤師にご相談ください。

○錠は骨粗しょう症の骨を丈夫にし、骨折を防ぐためのお薬です。ご自分の判断で、服用を中止しないようにしてください。

歯科・口腔外科を受診される場合はこのカードを先生にご提示ください。
歯科・口腔外科の先生方へ

患者さんはビスホスホネート製剤〇〇を服用中、または服用されたことがあります。
ビスホスホネート製剤治療患者において顎骨壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがありますので抜歯等の侵襲的歯科処置はできるだけ避けてください。

骨粗しょう症の治療のため〇〇錠を服用しています。

飲み始めた日	年 月 日
中断・終了した日	年 月 日
病医院・薬局名	

お薬の服用を中断・終了された後も大切にお持ちください。
〇〇製薬株式会社

歯科受診の際には、歯科医師に骨粗しょう症の薬を服用・使用していることをお伝えください。処方時に受け取るカードやお薬手帳を活用しましょう。